

Indications

Combispot 50 mg/60 mg Solution spot-on pour les chats et furets.

Propriétés

Chez les chats :

A utiliser contre les infestations de puces seules ou en association avec des tiques et /ou des poux broyeurs : Traitement des infestations par les puces (*Ctenocephalides* spp.). L'effet insecticide sur les puces adultes provenant de nouvelles infestations est visible pendant 4 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs et des larves et pupes provenant des œufs pondus par les puces adultes pendant 6 semaines après l'application. Traitement des infestations par les tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). L'efficacité acaricide contre les tiques persiste pendant 2 semaines. Traitement des infestations par les poux broyeurs (*Felicola subrostratus*)

Chez les furets :

A utiliser contre les infestations de puces, seules ou en association avec des tiques. Traitement des infestations par les puces (*Ctenocephalides* spp.). L'effet insecticide sur les puces adultes provenant de nouvelles infestations est visible pendant 4 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs et des larves et pupes provenant des œufs pondus par les puces adultes. Traitement des infestations par les tiques (*Ixodes ricinus*) pendant 4 semaines.

Mode d'utilisation

Application cutanée. Posologie : Une pipette de 0,5 ml pour un chat, en une application cutanée. L'intervalle de traitement minimum est de 4 semaines. Une pipette de 0,5 ml par furet correspondant à une dose de 50 mg pour le fipronil et de 60 mg pour le (S) -méthoprene par furet, en une application cutanée. L'intervalle de traitement minimum est de 4 semaines.

Mode d'administration au dos de l'étui :

Tenir la pipette droite. Tapoter la partie étroite de la pipette pour s'assurer que son contenu reste dans la partie large et casser l'embout d'un geste sec en direction du dos de la pipette. Ecarter les poils au niveau du dos de l'animal, à la base du cou en face des omoplates, jusqu'à ce que la peau soit visible. Placer l'embout de la pipette sur la peau et presser plusieurs fois afin de vider totalement le contenu de la pipette sur la peau en un point. Se laver les mains après application. Des effets transitoires sur le pelage (poils gras/agglomérés) peuvent être observés au site d'application.

Précautions d'emploi

Ne pas utiliser sur des chatons de moins de 8 semaines et / ou pesant moins de 1 kg. Ne pas utiliser sur des furets de moins de 6 mois. Ne pas utiliser sur les animaux malades (par exemple, les maladies systémiques, fièvre) ou les animaux convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets indésirables secondaires parfois létaux peuvent survenir. L'utilisation du produit n'est pas recommandée chez les espèces non ciblées par ce produit

Composition

Solution ponctuelle. Solution ambre claire.

Chaque pipette de 0.5 ml contient :

Substances actives :

| | |
|----------------|----------|
| Fipronil | 50.00 mg |
| (S)-methoprene | 60.00 mg |

Excipients:

| | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
| Butylhydroxyanisole (E320) | 0.10 mg | Butylhydroxytoluène (E321) | 0.05 mg |
|----------------------------|---------|----------------------------|---------|